

Narkotikabruk i Oslo

Hovedtrekk i utviklingen på 2000-tallet

Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS

www.sirus.no

Tema:


Hva har skjedd på 2000-tallet – blir alt verre?

- Antall brukere av illegale stoffer (rekreasjonsbrukere og sprøytemisbrukere)
- Kjønnforskjeller
- Utvikling over tid
- Norge versus resten av Europa

Informasjonskilder:


- Spørreundersøkelser
- Spesialundersøkelser
- Offentlige registre

Andelen 15-20 åringer i Oslo som oppgir noen gang bruk av cannabis




Noen gangs bruk av cannabis.


ESPAD 2007 (elever, 15-16 år)




Noen gangs bruk av cannabis. ESPAD 2007 (15-16 åringer)




Andelen 15-20 åringer i Norge som oppgir noen gangs bruk av tunge stoffer




Noen gangs bruk av illegale rusmidler utenom cannabis. ESPAD 2007 (elever, 15-16 år)




Noen gangs bruk av illegale stoffer utenom cannabis. ESPAD 2007




Noen gangs bruk av narkotiske stoffer, 21-30 år Oslo, 2010



Tall for overdosedødsfall, Oslo og Norge



Overdosedødsfall i Norge og Europa




Hvorfor så høye tall i Norge?

- Ulik registreringspraksis, obduksjonsfrekvens, prosedyrer
- Ulike stadier i epidemien?
- Lav forekomst av HIV/AIDS blant sprøytemisbrukere, dvs. "konkurrerende" dødsårsaker
- Sterk sprøytekultur i Norge

Dilemma: Opprettholder vi en dødelig sprøytekultur med skadereduksjon og ulike former for hjelpetiltak?

Dødlighetsmultiplikatoren



$$NHI_t = \frac{D_t}{MR_t * S_t}$$


NHI = Antallet som injiserer heroin

D = Antall overdosedødsfall

MR = Total dødelighetsrate blant de som injiserer heroin

S = Andel overdosedødsfall blant alle typer av dødsfall i gruppen


Anslag for sprøytemisbrukere i Oslo og Norge, 1996-2009



Sprøytemisbrukere i Oslo

- **Gjennomsnittsalder øker, kjønnsfordelingen stabil**
- **Økt gjennomsnittsforbruk av heroin og amfetamin**
- **Flere har brukt metadon og subutex/subuxone**
- **Fortsatt en viss nedgang i narkotikapriser**

Prisutvikling på heroin og amfetamin



Sprøytemisbrukere i Oslo

- **Gjennomsnittsalder øker, kjønnsfordelingen stabil**
- **Økt gjennomsnittsforbruk av heroin og amfetamin**
- **Flere har brukt metadon og subutex/subuxone**
- **Fortsatt en viss nedgang i narkotikapriser**
- **Økt erfaring med heroinrøyking**
- **Endret debutalder**

Sprøytemisbrukere, inndelt etter tiår for oppstart

	Totalt	Før 1980	1980-1989	1990-1999	2000-2008
Røykt heroin første gang de brukte	43 (2028)	16 (324)	33 (434)	58 (264)	73 (302)

Sprøytemisbrukere, inndelt etter tiår for oppstart

	Totalt	Før 1980	1980-1989	1990-1999	2000-2008
Røykt heroin første gang de brukte	43 (2028)	16 (324)	33 (434)	58 (264)	73 (302)
Gjennomsnittlig debutalder for injeksjon	19.4 (2081)	15.5 (466)	17.4 (613)	21.6 (771)	25.6 (228)

Sprøytemisbrukere, inndelt etter tiår for oppstart

	Totalt	Før 1980	1980-1989	1990-1999	2000-2008
Røykt heroin første gang de brukte	43 (2028)	16 (324)	33 (434)	58 (264)	73 (302)
Gjennomsnittlig debutalder for injeksjon	19.4 (2081)	15.5 (466)	17.4 (613)	21.6 (771)	25.6 (228)
Stofftype i første sprøyte					
Heroin	32	8	26	37	52
Amfetamin	59	70	67	49	42
Morfin	7	20	5	3	4
Annet	2	3	2	2	3
	(1514)	(314)	(396)	(573)	(223)

Oppsummering

- **Nedgang i bruken av illegale stoffer siden år 2000, noe økt bruk av kokain**
- **Nedgang i antall narkotikadødsfall, men Norge ligger fortsatt svært høyt i europeisk sammenheng**
- **Færre sprøytemisbrukere enn for 10 år siden**
- **Fortsatt ventetid på behandling, for dårlig koordinering og oppfølging i etterkant**
- **Substitusjonsmedikamenter alene ikke nok**